

Vacuna	Reacción local (dolor, tumefacción, enrojecimiento)	Fiebre	Irritabilidad, malestar y síntomas no específicos
BCG	Común	-	-
Haemophilus infl. tipo b	5-15%	2-10%	-
Hepatitis B	Hasta 30% en adultos Hasta 5% en niños	1-6%	-
SRP	Hasta 5%	Hasta 5%	Hasta 5%
Tétanos/Td	Hasta 10% (1)	Hasta 10%	Hasta 10%
DTP (2)	Hasta 50%	Hasta 50%	Hasta 60%

Vacuna	Reacción	Tiempo que tarda en aparecer	Tasa por un millón de dosis
BCG	Linfadenitis supurativa	2-6 meses	<b>100 - 1.000</b>
	Osteítis por BCG	1-12 meses	<b>1-700</b>
	"BCGitis" diseminada	1-12 meses	2
Hib	Ninguna conocida	-	-
Hepatitis B	Anafilaxia	0-1 hora	1-2
SRP (1)	Convulsiones febriles	5-12 días	<b>333</b>
	Trombocitopenia	15-35 días	33
	Anafilaxia	0-1 hora	1-50
Tétanos	Neuritis del plexo braquial	2-28 días	5-10
	Anafilaxia	0-1 hora	1-6
	Absceso estéril	1-6 semanas	6-10
Tétanos/difteria	Igual que tétanos		
DTP	Llanto persistente (>3 h)	<b>0-24 horas</b>	<b>1.000-60.000</b>
	Convulsiones	<b>0-1 día</b>	<b>570 (2)</b>
	hipotonía/hiporreactividad	<b>0-24 horas</b>	<b>570</b>
	Anafilaxia	<b>0-1 día</b>	<b>20</b>
	Encefaloptía	<b>0-3 días</b>	<b>0-1</b>

